




# 3<sup>rd</sup> Romanian Master of Sciences 2010

## Physics – Theoretical Tour

### FIZICĂ CLASICĂ

#### A. ELECTRICITATE

În circuitul din figură sursa este ideală (rezistența internă este nulă) iar rezistențele celor două bobine se pot neglija. F este o siguranță fuzibilă (de rezistență nulă) ce se arde instantaneu atunci când curentul ajunge exact la valoarea  $I_F = 200$  mA. La momentul  $t = 0$  curenții în circuit sunt nuli, iar întrerupătorul S închide circuitul.



- Calculați și reprezentați grafic dependențele de timp pentru curenții din circuit până la momentul arderii siguranței. Calculați la ce moment de timp se arde siguranța.
- Determinați valorile și vitezele de variație ale tuturor curenților, imediat după arderea siguranței.
- Calculați valorile curenților pentru  $t \rightarrow \infty$ .


Aplicație numerică:  $V = 10$  V;  $L_1 = 10$  mH;  $L_2 = 5$  mH;  $I_F = 0,2$  A;  $R_1 = 1$  k $\Omega$ ;  $R_2 = 200$   $\Omega$ .

(conf. dr. Petrică Cristea, conf. dr. Mihai Dincă, Facultatea de Fizică, Universitatea București)

#### B. „SCARA” LUI MICHELSON

Rețeaua de difracție “scara” lui Michelson este un aparat spectral interferențial compus dintr-un număr de lame de sticlă cu o foarte bună omogenitate, având fiecare grosimea  $h$  și indicele de refracție  $n$ . Lărgimea unei trăsături se notează cu  $a$ .

Un fascicul monocromatic de lumină cu lungimea de undă  $\lambda$  cade normal pe suprafața celei mai mari lame, așa ca în figură. Difracția se produce în punctul ultim comun a două lame vecine.



- Deduceți condiția de obținere a maximelor principale de difracție, în funcție de  $a$ ,  $h$ ,  $n$ ,  $\lambda$ , și unghiul  $\alpha$  făcut de razele difractate cu direcția inițială.

- b.** Câte maxime principale sunt observabile practic? (Se consideră maxime observabile cele conținute în maximul principal de difracție corespunzător unei trăsături.)
- c.** Deduceți domeniul de dispersie  $\Delta\lambda$  (lărgimea maximă a domeniului spectral cu care poate fi iluminat aparatul pentru a nu exista suprapuneri între ordine).

Aplicație numerică:  $h = a = 1\text{ cm}$ ;  $n = 1,5$ ;  $\lambda = 500\text{ nm}$ .

(lect. dr. Marian Băzăvan, Facultatea de Fizică, Universitatea București)



## 3<sup>rd</sup> Romanian Master of Sciences 2010

### Physics – Theoretical Tour

#### RELATIVITATE RESTRÂNSĂ: RACHETĂ CARE ACCELEREAZĂ

La momentul de timp  $t = 0$  în sistemul de referință al Pământului, o rachetă aflată inițial în repaus pornește de pe Pământ într-o călătorie prin spațiu, pe o traiectorie rectilinie. Oriunde nu se va menționa altceva, racheta va fi considerată punctiformă. Presupuneți ipoteza simplificatoare că forța de tracțiune a motoarelor și masa de repaus a rachetei sunt constante în timp în sistemul de referință al Pământului. Neglijați orice influență gravitațională și/sau atmosferică. Fie  $c$  viteza de propagare a luminii în vid, și  $a$  accelerația inițială a rachetei.

- Desenați schematic graficul vitezei rachetei în funcție de timp în sistemul de referință al Pământului.
- Cât „cântărește” un astronaut cu masa de repaus  $m$  la bordul navei?
- Exprimați coordonata  $x$  a rachetei pe axa de mișcare, ca funcție de timpul de pe Pământ  $t$ , în funcție de  $t$ ,  $c$ , și  $a$ . (Pământul se consideră ca fiind originea axei.)
- Desenați pe o diagramă spațiu-timp linia de univers a rachetei, reprezentând doar coordonatele de interes,  $x$  și  $ct$ .
- Determinați ultimul moment de timp  $t_0$  la care ar mai putea fi emis de pe Pământ un semnal luminos, astfel încât el să mai poată ajunge din urmă racheta.

La momentul de timp  $c/2a$  în sistemul Pământului, o stație radio de pe Pământ inițiază un proces recurent de comunicare cu racheta: stația emite un flux monocromatic de fotoni care, atunci când sunt recepționați de rachetă, sunt reflectați imediat înapoi către Pământ. Fotonii ajung la stația radio și sunt reflectați imediat înapoi către rachetă, iar procesul se repetă. Atunci când sunt emiși prima dată, fotonii au frecvența  $\nu_0$  în sistemul de referință al Pământului.

- Determinați momentul de timp  $T'$  în sistemul de referință al rachetei, la care ea recepționează prima dată un semnal de pe Pământ. (La lansare, ceasurile de pe rachetă sunt perfect sincronizate cu cele de pe Pământ.)
- Adăugați pe graficul de la punctul **d** linia de univers a unui foton din momentul când este emis de pe Pământ și până când este recepționat prima dată de navă.
- Determinați frecvența ultimului flux de fotoni recepționați de rachetă.
- Determinați frecvența ultimului flux de fotoni recepționați de stația radio.



# 3<sup>rd</sup> Romanian Master of Sciences 2010

## Physics – Theoretical Tour

### COSMOLOGIE NEWTONIANĂ

Scopul acestei probleme este de a descrie foarte schematic maniera în care se comportă universul și soarta finală a universului, utilizând concepte simple de mecanică newtoniană. Pentru aceasta, vom începe prin a presupune valabilitatea așa-numitului *Principiu al Cosmologiei*, care afirmă caracterul omogen și izotrop al universului. De asemenea, va trebui să acceptăm ca adevărat faptul că universul a fost inițiat de Big Bang.

Considerațiile de mai sus ne conduc la concluzia că, văzută din orice punct al spațiului, expansiunea universului trebuie descrisă printr-un unic *factor de scară*,  $R(t)$ , care este independent de poziție. Cu alte cuvinte, dat fiind un punct oarecare având actualmente vectorul de poziție  $\mathbf{r}_0$ , la orice alt moment de timp poziția lui a fost/va fi caracterizată de

$$\vec{r}(t) = R(t) \cdot \vec{r}_0 .$$

(Termenul tehnic folosit de matematicieni pentru o astfel de transformare a spațiului este *omotetie*.) Evident, în clipa de față  $t_0$ ,  $R(t_0) = 1$ , iar în momentul Big Bang-ului,  $R(0) = 0$ .

Scopul principal al problemei este de a stabili modurile posibile de comportare ale lui  $R(t)$ .

**1. Legea lui Hubble** stabilește relația care trebuie să existe între vectorul de poziție  $\mathbf{r}$  și viteza  $\mathbf{v}$  ale oricărui punct din spațiu, pentru ca expansiunea universului să fie omogenă și izotropă. Modul în care viteza depinde de vectorul de poziție este exprimat prin intermediul unui factor multiplicativ având unități de măsură convenabile, numit *constanta Hubble*,  $H$ . Cu toate acestea, acest factor nu este o constantă, ci depinde de timp, așa ca și  $R(t)$ . Vom nota  $H(t_0) = H_0$ .

**a.** Deduceți Legea lui Hubble.

**b.** Arătați că, în aproximația mecanicii newtoniene, Legea lui Hubble este valabilă pentru orice observator care se consideră a fi „în repaus“ într-un punct oarecare al universului.

**c.** Valoarea actuală a constantei Hubble,  $H_0$ , poate fi determinată experimental măsurând distanța până la o galaxie oarecare și viteza cu care ea se îndepărtează de noi. Astfel, ne găsim în situația de a putea face o primă și grosolană aproximare a vârstei universului,  $t_0$ . Pentru aceasta, să presupunem (în mod incorect!) că vitezele actuale ale punctelor spațiului au fost tot timpul aceleași încă din momentul Big Bang-ului.

Exprimați  $t_0$  în funcție de  $H_0$ . (Este interesant de menționat faptul că valoarea observată a lui  $H_0$  ne dă o estimare a lui  $t_0$  în jurul valorii de  $1,38 \cdot 10^{10}$  ani. În cele ce urmează, această valoare va fi numită *timpul Hubble*,  $t_H$ .)

**2.** Vom studia acum un model ca de „praf lipsit de presiune“ al universului. Prin „praf“ se înțelege că universul conține doar substanță obișnuită, fără radiații (fotoni), fără neutrini, fără materie nebarionică sau orice altceva. Prin „lipsit de presiune“ se

înțelege că fiecare punct al spațiului este înzestrat cu o aceeași densitate  $\rho$  dependentă de timp, și că masa totală a universului are o valoare fixată. Ca atare, densitatea variază doar ca urmare a expansiunii universului.

- d.** Găsiți relația dintre  $\rho(t)$  și  $R(t)$  în funcție de densitatea actuală,  $\rho(t_0) = \rho_0$ .
- e.** Fie o pătură sferică infinit de subțire, de masă  $m$  și rază actuală  $r_0$ . Exprimați energia totală a păturii la un moment oarecare de timp în funcție de  $m$ ,  $r_0$ ,  $R(t)$ ,  $H(t)$ ,  $\rho(t)$ , și constanta atracției universale  $G$ .
- f.** Definim așa-numita *densitate critică*,  $\rho_c$ , ca fiind valoarea pentru care energia de mai sus este zero. Distincția între diferitele tipuri de universuri este făcută prin intermediul unei mărimi fizice numite *parametru al densității*,  $\Omega(t)$ , care reprezintă raportul dintre densitatea propriu-zisă a universului și densitatea critică la acel moment de timp.
- Precizați cum se comportă universul dacă  $\Omega > 1$  (univers „închis“), dacă  $\Omega = 1$  (univers „plat“), și dacă  $\Omega < 1$  (univers „deschis“).
- g.** Exprimați energia totală  $E$  a păturii sferice în funcție de  $m$ ,  $r_0$ ,  $R(t)$ ,  $H(t)$ , și  $\Omega(t)$ , și arătați că tipul universului nu se schimbă în timp.
- h.** Folosind Legea lui Hubble, găsiți ecuația implicită pentru variația în timp a lui  $R(t)$  în funcție de  $H_0$  și  $\Omega_0 = \Omega(t_0)$ . Arătați că la momentul Big Bang-ului comportarea universului era în esență oricât de apropiată de cea a unui univers plat.

**3.** Suntem acum în situația de a face o aproximare ceva mai exactă a vârstei universului, în ipoteza unui univers plat ( $\Omega_0 = 1$ ).

- i.** Rezolvați ecuația de la punctul **h** pentru a găsi în mod explicit  $R(t)$ , și exprimați  $t_0$  în funcție de  $t_H$ .
- j.** Reprezentați schematic pe un grafic factorul de scară în funcție de timpul măsurat în unități  $t_H$ .

**4.** Vom studia acum cazurile ceva mai complexe ale unui univers închis ( $\Omega_0 > 1$ ) și respectiv deschis ( $\Omega_0 < 1$ ).

**k.** Pentru  $\Omega_0 > 1$ , găsiți dependența inversă, a timpului în funcție de factorul de scară, în funcție de  $H_0$  și  $\Omega_0$ .

*Indicație:*

$$\int \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx = \arcsin(\sqrt{x}) - \sqrt{x(1-x)} + C.$$

**l.** Pentru a putea studia  $R(t)$ , vom căuta să parametrizăm funcția. Pentru aceasta, notăm funcția  $\arcsin$  de mai sus cu  $p/2$ . Exprimați  $R(p)$  și  $t(p)$ .

**m.** Exprimați vârsta universului  $T$  în momentul final al Big Crunch-ului (opusul Big Bang-ului) în funcție de  $t_H$  și  $\Omega_0$ .

**n.** Găsiți dimensiunea maximă (adică  $R$  maxim) a universului în funcție de  $\Omega_0$ .

**o.** Pentru  $\Omega_0 = 2$ , reprezentați schematic  $R$  în funcție de timpul  $t$  măsurat în unități  $t_H$ .

**p.** Pentru  $\Omega_0 < 1$ , găsiți dependența inversă  $t(R)$ , în funcție de  $H_0$  și  $\Omega_0$ .

*Indicație:*

$$\int \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx = -\operatorname{arcsinh}(\sqrt{x}) + \sqrt{x(1+x)} + C.$$

**q.** Notați funcția  $\operatorname{arcsinh}$  de mai sus cu  $p/2$ , și exprimați  $R(p)$  și  $t(p)$ .

**r.** Arătați că, într-un final, expansiunea universului tinde către un ritm uniform, și exprimați această rată în funcție de  $H_0$  și  $\Omega_0$ .

**s.** Pentru  $\Omega_0 = 0,5$ , reprezentați schematic  $R(t)$ .